

ワサビ・ジャポニカ



ランプ点灯時間/1日 (時間) AQUA VEGA A+B ml/Litre RHIZOTONIC ml/Litre CANNAZYM ml/Litre EC+ PPM

GROW

スタート - 約3~5週の期間
茎部から発根が見られてからが、スタートです。

14	1 - 1.5	2.5	-	0.3 - 0.9	200 - 560
----	---------	-----	---	-----------	-----------

(栄養)生長期 - 約18~24ヶ月の期間
茎の伸長期間。

14	1 - 1.5	0.5	2.5	0.3 - 0.9	200 - 560
----	---------	-----	-----	-----------	-----------

BLOOM

収穫期 - 約2週間
十分なサイズの大きさに生長してから。

12	1 - 1.5	-	2.5	0.3 - 0.9	200 - 560
----	---------	---	-----	-----------	-----------

- 1) 収穫可能なサイズに生長したら、収穫したい時期から逆算して収穫期へと移行させてください。開花している期間も含めます。もし休眠に入れる場合は、気温や水温を冬の環境にします。
- 2) ワサビがよく生長する環境は、培養液の水温が11~14°C、気温は8~18°Cです。それよりも高い水温/気温では、高い湿度を好みます。
- 3) 発根前の培養液のEC値は、0.1 μS/cm (100ppm) 以下からスタートしてください。
- 4) 収穫期間を長めにするほど、硬く仕上がりと辛みがのっておいしくなります。
- 5) ワサビは高温が苦手です。気温が高すぎると、病気の発生や立枯れが起きやすくなります。
- 6) ワサビは日本の山の木陰で育つ強い光が苦手な半陰性植物です。日照のよい場所やグロウランプで育てる場合は、およそ50~80%の遮光をしてください。
- 7) 2度目の収穫後は、植えかえをするか休眠に入れてください。
- 8) 根幹または主茎が15~20cmほど伸び、1.25~2.5cmほどの太さになったら収穫可能です。横枝は株分けが可能で、2回まで収穫ができます。元気で新鮮な枝を選びます。
- 9) 補光処理をしないかぎり、ワサビは4月~5月の春になると自然に花芽が付きます。肥料の配合は生長期のレシピのままで大丈夫です。